

BoxaGrippal® Erkältungssaft

BoxaGrippal® Erkältungssaft.

Wirkstoffe: 200 mg Ibuprofen + 30 mg Pseudoephedrinhydrochlorid/ 10ml Susp.

Sonstige Bestandteile: Glycerol, Xanthangummi, Maltitol, Polysorbat 80, Saccharin-Na, Citronensäure-Monohydrat, Na-methyl- und Na-propyl-4- hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Kirscharoma (enth. Propylenglycol, Aromastoffe, Na-citrat-Puffer), gerein. Wasser.

Anwendungsgebiet: Symptomat. Behandl. d. Schleimhautschwellg v. Nase u. Nebenhöhlen verb. m. Kopfschmerzen, Fieber u. erkältungsbed. Schmerzen.

Gegenanzeigen: Überempf. geg. Ibuprofen, Pseudoephedrin, Na-methyl- oder Na-propyl-4-hydroxybenzoat od. sonst. Bestandt.; Pat. < 15 J.; Schwangersch. und Stillzeit; durch NSAIDs ausgelöste allerg. Rkt. od. pfeif. Atmung i. d. Anamn.; gleichz. Anw. -v. and. ähnl. Arzneimitteln od. -v. Blutverdünn., Kortikosteroiden, Arzneimittel ggn. Blutgerinnselbldg, Lithium, Methotrexat, Antidepressiva (od. Anw. v. Antidepressiva innerh. d. letzten zwei Wo.); bei Herzerkr.; Diab. mell.; Phäochromozytom; Glaukom; Prostatahyperplasie; schw. Nieren- od. Lebererkr.; bei Magengeschwür od. and. Magenbeschw., Gehirnblutg., ungeklärten Blutgerinnungsstör., Krampfanf., Schlaganf. od. Herzinfarkt in d. Anamn.; bei syst. L. erythematodes.

Warnhinweise: Enthält Maltitol, Na-methyl- und Na-propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.).

Nebenwirkungen: Magen-/Darmentzünd., manchm. mit Blutverlust verb. m. Blutarmut; Entzünd. der Speiseröhre; Verdauungsstör.; Magenschmerzen; Übelkeit; Erbrechen; Blähungen; Durchfall; Appetitlosigk.; Verstopfung; Krankheitsgefühl; Mundtrockenh.; Durst; Magen-/Darmgeschw.; Verschlecht. v. infekt. Entzünd., Asthma od. Colitis ulcerosa/M. Crohn; allerg. Rkt. bis hin zu schweren allg. Überempf.-reaktionen (einschl. Bronchospasmus u. Blutdruckabfall); Kopfschmerzen; Schwindel; Schlaflosigk.; Unruhe; Reizbark.; Müdigk.; Sehstör.; Schlaflosigk.; Nervosität; Angstzust.; Unruhe; Zittern; Halluzinat.; Ohrgeräusche; Nierenprobl. (Papillennekrose); erhöh. Harnsäure im Blut; Schwellungen; Bluthochdruck; Herzklopfen; unregelm./beschl. Herzschlag; asept. Meningitis (b. Pat. m. Autoimmunerkr.); Stör. d. Blutbildung (Anämie, Leuko-, Neutro-, Thrombozyto-, Panzytopenie, Agranulozytose); psychot. Rkt.; Depress.; Brustschmerzen; Herzinfarkt; Entzünd. der Bauchspeicheldrüse; Leberstör.; Leberversagen; Hepatitis; Hautausschläge; Hautrötung; überm. Schwitzen; Juckreiz; Nesselsucht; schwere Formen v. Hautrkt. wie exfoliat. Dermatitis, bullöse Exantheme, SJS, E. multiforme, TEN, AGEP, DRESS; Haarausf.; Weichteilkomplik. währ. Varizelleninfekt.; Verhaltensstör.; Schlaganfall; Krampfanfall; Miktionsbeschw. b. Prostatavergröß.

Apothekenpflichtig.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main.

Stand: Mai 2018 (SADE.BISO13.18.08.2448(1))

